

INKAMINOCAL

1. CARACTERÍSTICAS Y MODO DE ACCIÓN

Corrector salino y de carencia de Calcio líquido totalmente soluble y asimilable, contiene:

Calcio acomplexado con ácidos policarboxílicos, lignosulfatados y ácidos fúlvicos

- ✓ Activa, regula la división y el alargamiento celular.
- ✓ Influye en la compartimentación de la célula relacionada con la especialización de los órganos celulares.
- ✓ Ayuda al crecimiento de los vegetales y engorde de frutos para la correcta maduración de la cosecha.
- ✓ Mejora el equilibrio hídrico, la turgencia de los tejidos y firmeza de los frutos.
- ✓ Aplicado al suelo, aumenta la aireación y la retención de agua y nutrientes.
- ✓ Mejora la estructura del suelo, absorción de nutrientes, capacidad de intercambio catiónico y activa la vida microbiana.



2. COMPOSICIÓN

Componentes	Concentración
Óxido de Calcio quelatado (CaO) p/v	15.5%
Ácidos fúlvicos, policarboxílicos y lignosulfatados	70.0%

3. APLICACIÓN Y DOSIS

CULTIVOS	DOSIS L/Ha	N° App	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Arándano	0.5-1.0	2.0-3.0	1° aplicación en prefloración, 2° en cuajado intermedio, 3° repetir cada 10 días después de lo anterior.
Ají, Tomate y Solanáceas	0.5-1.0	1.0-2.0	Inicio de floración, frecuencia de aplicación: cada 15 a 20 días.
Alcachofa	0.5-1.0	2.0-3.0	1° aplicación 20 días después del trasplante, 2° en prefloración, 3° 10 días después de la aplicación anterior.
Apio, Zanahoria	0.5-1.0	1.0-2.0	1° aplicación a partir de 6 hojas verdaderas, 2° repetir cada 15 días, después de lo anterior
Arroz	0.5-1.0	1.0-2.0	1° aplicación en punto de algodón, 2° en desarrollo de panoja, 3° en llenado de grano,
Banano	0.5-1.0	2.0-3.0	1° inicio de la formación de vela, 2° desarrollo del racimo.
Brócoli, Coliflor y Col	0.5-1.0	1.0-2.0	1° aplicación a los 20 días después del trasplante, 2° 15 días después de la primera aplicación.

CULTIVOS	DOSIS	N°	ÉPOCA DE APLICACIÓN
	L/Ha	App	

Cebolla, Ajo	0.5-1.0	1.0-2.0	1° aplicación en la fase inicial del cultivo, 2° en plena bulbificación, 3° al inicio de la maduración.
Espárrago	0.5-1.0	1.0-2.0	1° aplicación al primer brotamiento, segundo y tercer brotamiento.
Fresa	0.5-1.0	1.0-2.0	1° aplicación 20 días después del trasplante, 2° en prefloración, 3° 10 días después de la aplicación.
Leguminosa	0.5-1.0	1.0-2.0	1° aplicación en botón floral, 2° 15 días después de la primera aplicación.
Manzano, Melocotón y Granado	0.5-1.0	3.0-5.0	1° aplicación en prefloración, 2° en floración, 3° en cuajado intermedio, 4° en crecimiento y desarrollo de fruto.
Mango, Palto, Cítricos Maracuyá, Granadilla	0.5-1.0	3.0-5.0	1° aplicación en prefloración, 2° en floración, 3° después del cuajado de fruto, 4° 15 días después de la aplicación anterior.
Tuberosas	0.5-1.0	1.0-2.0	1° aplicación al inicio de tuberización, realizar las aplicaciones cada 10 a 15 días.
Pepino, Sandía, Melón	0.5-1.0	1.0-2.0	1° aplicación en prefloración, 2° después del cuajado de frutos,
Vid	0.5-1.0	3.0-5.0	1° aplicación en prefloración, 2° al final del cuajado de fruto, 3° al inicio del envero de la baya, 4° 7 días después de la anterior aplicación.

***Consulte con un Ingeniero Agrónomo**

4. COMPATIBILIDAD

Inkaminocal es compatible con la mayoría de los fertilizantes y Fitosanitario normalmente utilizados. No obstante, dada la diversidad de los productos ajenos a nuestra compañía que se pueden emplear en diversas mezclas, se recomienda al usuario efectúe bajo su responsabilidad y costo pruebas de compatibilidad previa a la utilización del producto, a fin de detectar posibles reacciones. No es compatible con fuentes hidróxidos alcalinos y sales fosfatadas.

5. TOXICIDAD

Inkaminocal no es un producto tóxico a las dosis recomendadas, es un producto natural que no posee residuos de ningún tipo y que no genera riesgo y/o peligro para la salud humana y el medio ambiente.

6. RECOMENDACIONES

Agitar el producto antes de usar. Durante la aplicación foliar, mojar bien todos los órganos verdes de la planta incluyendo el envés de las hojas, aplicar el producto preferentemente a la primera hora de la mañana o a la última de la tarde, no aplicar en horas de alta incidencia solar y calor.

7. PRECAUCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Inkaminocal es un producto que no necesita ninguna condición especial de aplicación y manejo. Almacenarlo en su envase primario original, debidamente cerrado y etiquetado, en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, no exponiéndolo directamente a los rayos solares. No transportar ni almacenar el producto junto a otros productos formulados para fines diferentes al mismo.

8. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El contenido descrito en el presente documento tiene carácter meramente informativo. Se recomienda leer detenidamente y seguir las instrucciones de uso descritas en la ficha técnica y la hoja de seguridad del producto antes del uso.