

Conetrap Ceratitis

Dispositivo de captura masiva para el control de la mosca de la fruta



Descripción

Conetrap Ceratitis es un dispositivo de captura para el monitoreo y control de la mosca de la fruta (*Ceratitidis capitata*).

Composición

Mosquero Conetrap, conformado por base amarilla cónica y tapa translúcida de material plástico.

Atrayente Conetrap Ceratitis, atrayente alimenticio específico con 2 componentes (acetato de amonio y Trimetilamina hidrocioruro) conocidos por su alta eficacia y selectividad para atraer la mosca de la fruta (*Ceratitidis capitata*).

Usos, plagas y dosis autorizadas

USOS AUTORIZADOS	PLAGA	DOSIS	
		MONITOREO	CONTROL
Cítricos	Mosca mediterránea de la fruta (<i>Ceratitidis Capitana</i>)	2-4 Trampas/ha	50-80 Trampas/ha
Uva	Mosca mediterránea de la fruta (<i>Ceratitidis Capitana</i>)	2-4 Trampas/ha	40-80 Trampas/ha
Mango	Mosca mediterránea de la fruta (<i>Ceratitidis Capitana</i>)	2-4 Trampas/ha	40-80 Trampas/ha
Arándano	Mosca mediterránea de la fruta (<i>Ceratitidis Capitana</i>)	2-4 Trampas/ha	40-80 Trampas/ha
Frutales de pepita / Frutales de hueso	Mosca mediterránea de la fruta (<i>Ceratitidis Capitana</i>)	2-4 Trampas/ha	40-80 Trampas/ha

Persistencia: 180 días

Plazo de seguridad: No aplicable

Momento de colocación

Los dispositivos de captura masiva deben colocarse 4 meses antes de la fecha prevista de cosecha o previa que los frutos sean susceptibles al ataque de la mosca de la fruta.

Forma de colocación

Colocar los dispositivos de captura masiva colgándolos en las ramas del árbol a media altura de la copa, con orientación sudoeste con distribución uniforme a lo largo de toda área a proteger.