

Base Conetrap

Dispositivo de captura masiva para el control de la mosca de la fruta



Descripción

Base conetrap parte del kit conetrap de forma cónica, con 4 agujeros que permiten la liberación del atrayente alimenticio y posteriormente el ingreso de la mosca de la fruta (*ceratitis capitata*).

Composición

Base Conetrap, conformado por cono de plástico color amarillo.

Usos, plagas y dosis autorizadas

USOS AUTORIZADOS	PLAGA	DOSIS	
		MONITOREO	CONTROL
Cítricos	Mosca mediterránea de la fruta (<i>Ceratitidis Capitana</i>)	2-4 Trampas/ha	50-80 Trampas/ha
Uva	Mosca mediterránea de la fruta (<i>Ceratitidis Capitana</i>)	2-4 Trampas/ha	40-80 Trampas/ha
Mango	Mosca mediterránea de la fruta (<i>Ceratitidis Capitana</i>)	2-4 Trampas/ha	40-80 Trampas/ha
Arándano	Mosca mediterránea de la fruta (<i>Ceratitidis Capitana</i>)	2-4 Trampas/ha	40-80 Trampas/ha
Frutales de pepita / Frutales de hueso	Mosca mediterránea de la fruta (<i>Ceratitidis Capitana</i>)	2-4 Trampas/ha	40-80 Trampas/ha

Persistencia: 1 a 2 años (de acuerdo al uso adecuado)

Plazo de seguridad: No aplicable

Momento de colocación

Los dispositivos de captura masiva deben colocarse 4 meses antes de la fecha prevista de cosecha o previa que los frutos sean susceptibles al ataque de la mosca de la fruta.

Forma de colocación

Colocarse conjuntamente con la tapa conetrap y el atrayente conetrap ceratitis. El dispositivo (kit conetrap) conformado por estos 3 elementos (tapas, base, atrayente), se cuelgan en las ramas del árbol a media altura de la copa, con orientación sudoeste con distribución uniforme a lo largo de toda área a proteger.